



## वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारीत व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

अ.क्र.	तपशील	सविस्तर माहिती
१	पीक/वाणाचे नाव	बाजरी : पीपीसी-६ (परभणी संपदा)
२	प्रसारीत केल्याचे वर्ष	२००४
३	प्रसारीत करणारी संस्था/विद्यापीठ	वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी
४	जमीन	मध्यम ते हलकी जमीन
५	हवामान	खरीप व उन्हाळी हंगामात
६	पेरणी/लागवडीचा कालावधी	जोडाओळीवर ४५ X १५ सेंमी / पेरणीयोग्य पाऊस पडल्यानंतर जुलैच्या पहिल्या पंधरवाड्यापर्यंत व उन्हाळयात जानेवारीच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यापासून फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवाड्यापर्यंत
७	प्रती एकर बियाणे	१ ते १.५ किलो
८	पीक व्यवस्थापन	<p>१ लागवडीचे/पेरणीचे व्यवस्थापन</p> <p>खोल नांगरणी करून वखराच्या दोन पाळ्या देवून जमीन सपाट, भुसभुशीत करून २ सेंमी खोलीवर बियाणाची पेरणी करावी, जास्त खोलीवर पेरणी करु नये.</p> <p>२ खत व्यवस्थापन</p> <p>७ गाडया शेणुखत प्रती हेक्टरी टाकावे, पेरणीवेळी नन्हा, स्फुरद व पालाश अनुक्रमे ३०:३०:३० किग्रॅ/हे. प्रमाणे टाकावे व पेरणी नंतर १ महिन्यानी नन्हा ३० किग्रॅ प्रती हेक्टरी देण्यात यावे.</p> <p>३ पाणी व्यवस्थापन</p> <p>३ ते ४ आठवडे पावसाचा ताण पडल्यास संरक्षित पाणी दयावे. संरक्षित पाणी पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेत, फुटव्याच्या अवस्थेत व दाणे भरण्याच्या अवस्थेत पाणी दयावे.</p> <p>४ कीड व्यवस्थापन</p> <p>बाजरीवर हिंगे अथवा भुंगे, सिटोनिड भुंग्यासाठी सदरील भुंगे जमा करून रॅकेलमिश्रित पाण्यात टाकून नाश करावा, प्रकाश सापळयाचा उपयोग करावा, मोसमी पाऊस सुरु होण्यापूर्वी शेताची व बांधाची स्वच्छता करून मिथील पॅराथिअॅन २ टक्के भुकटी अथवा एन्डोसल्फान ४ टक्के भुकटी २० किग्रॅ / हेक्टरी धुरळणी करावी. खोडकीडीसाठी कीड लागलेले पोंगे वेळोवेळी काढून जाळून टाकावीत, प्रादुर्भाव दिसून आल्यानंतर एन्डोसल्फान ३५ टक्के प्रवाही ३०० मिली पाण्यात अथवा एन्डोसल्फान ४ टक्के दाणेदार प्रती हेक्टरी पोंग्यात टाकावे. पहिली उपयायोजना उगवणीनंतर २५ दिवसांनी करावी, केसाळ अळी चा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास कणसावर एन्डोसल्फान ४ टक्के भुकटी २० किग्रॅ / हेक्टरी धुरळावी.</p> <p>५ रोग व्यवस्थापन</p> <p>केवडा/ गोसावी : या रोगाचे प्रतीकारक वाण वापरल्यास आणि वाढ व पिकाची फेरपालट केल्यास या रोगापासून बचाव होतो. तरीपण रासायनिक नियंत्रणासाठी अॅप्रॉन ३५ टक्के प्रवाही @ बिजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. अरगट/ कणसावरील चिकटा : या रोगाच्या प्रतीबंधासाठी २० टक्के मिठाच्या द्रावणात बियाणे टाकून तरंगणारे बी काढून नाश करावे व तळाशी राहिलेले बी पेरण्यास वापरावे, कणीस निसत असताना बावोस्टीन ०.१ टक्के बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.</p>
९	पिकाचा कालावधी	८० दिवस

१०	उत्पादकता	धान्य : ३० ते ३५ किंवटल कडबा : ५० ते ५५ किंवटल
११	वाणाची वैशिष्ट्ये/विशेष गुणधर्म	१. हा वाण केवडा रोगास प्रतीकारक आहे. २. दाण्याचा आकार मध्यम व रंग हिरवट असून १००० दाण्याचे वजन १० ते १२ ग्रॅम आहे. ३. हा सरळ वाण खरीप व उन्हाळी हंगामास उत्तम असून बाजरा + तूर (४:२) अंतरपिकास योग्य आहे.
१२	वाणासंबंधीचे छायाचित्रे	