

खरीप पिकांतील बीज प्रक्रिया

मे २०२६

डॉ.मिनाक्षी पाटील

सहाय्यक बिज संशोधन अधिकारी
मो. : ९४२३१०३५१९

डॉ.हि.वि.काळपांडे

सहाय्यी संचालक (बियाणे)
मो. : ९८५०२३७८३९

डॉ.खिजर बेग

संचालक संशोधन
मो. : ७३०४१९७८१०

बिज तंत्रज्ञान संशोधन व दर्जेदार बियाणे उत्पादन केंद्र, वनामकृवि, परभणी

कृषि उत्पादनामध्ये बीज प्रक्रिया हा महत्वाचा घटक आहे. तृणधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य पिकांवरील जमिनीतून व बियाणांपासून होणाऱ्या रोग व किडींचा प्रादुर्भाव कमी करून पिकांची वाढ होण्यासाठी बीज प्रक्रिया हे अत्यंत प्रभावी साधन आहे. एकात्मिक कीड व रोगाच्या व्यवस्थापनांतर्गत बीज प्रक्रिया या बाबीचा सर्वप्रथम समावेश होतो. बीज प्रक्रिया रोग व किडनियंत्रणाचा प्रतिबंधात्मक आणि फिकायतशीर उपाय आहे. बीज प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या रसायनातील क्रियाशील घटक फक्त बियाण्यावर प्रक्रिया केल्यामुळे जमिनीच्या अल्प पृष्ठभागाच्या सात्रिध्यात येतात त्यामुळे जमिनीतील रसायनांचे पर्यायाने वातावरणातील प्रदुषण कमी प्रमाणात होते.

बीज प्रक्रिया म्हणजे काय ? हलके, किडके बियाणे वेगळे करून बियाणे जमिनीत पेरण्यापूर्वी जमिनीतून किंवा बियाण्यातून पसरणारे विविध रोग व किडींचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी, तसेच बियाण्यांची उगवणक्षमता वाढविण्यासाठी व रोपे सतेज आणि जोमदार वाढवण्यासाठी बियाण्यांवर वेगवेगळी जैविक व रासायनिक औषधांची प्रक्रिया केली जाते, याला बीज प्रक्रिया असे म्हणतात.

बीज प्रक्रियेचे फायदे

- जमिनीतून व बियाणांद्वारे येणाऱ्या पसरणाऱ्या रोगांचा प्रादुर्भाव टाळता येतो.
- पेरणीसाठी एकसारखे बियाणे उपलब्ध होते व पेरणी सुलभ होते.
- बियाणाची उगवणक्षमता वाढते.
- पिक एकसारखे वाढते व मशागतीचा खर्च कमी होतो.
- रोपे सतेज व जोमदारपणे वाढतात.
- पिकाच्या उत्पादनात १५-२० टक्के वाढ होते.
- नत्र व स्फुरदाची उपलब्धता वाढते.
- साठवणगुहात साठवणुकीदरम्यान बियाण्याचे संरक्षण होते.
- रासायनिक खताची २०-२५ टक्के बचत होते.
- जमिनीचा पोत सुधारतो

रासायनिक बुरशीनाशकाच्या बीज प्रक्रियेबाबत काळजी

- बियाणे प्रक्रियेसाठी माती किंवा धातूचे भांडे किंवा प्लॅस्टिक पिशवीचा वापर करावा.
- बीजप्रक्रियेनंतर भांड्याचे झाकण किंवा प्लॅस्टिक पिशवीचे तोंड लगेच उघडू नये.
- बीजप्रक्रियेनंतर शिल्लक राहिलेले बियाणे जनावरांच्या किंवा मनुष्याच्या खाण्यासाठी वापरू नये.
- बीजप्रक्रिया करताना हातामध्ये रबरी मोजे व तोंडावर मास्क लावावा.
- बीजप्रक्रिया करताना तंबाखू खाणे, पाणी पिणे, सिगारेट ओढणे टाळावे.
- भुईमूग, सोयाबीन इ. पातळ साल असणाऱ्या बियाणाच्या बाबतीत बीजप्रक्रिया करताना जिवाणू संवर्धन अथवा बुरशीनाशकांचे घट्ट द्रावण करावे व बीजप्रक्रिया करताना बियाणाचे टरफल निघणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी.

रासायनिक बुरशीनाशकाची बिजप्रक्रिया करणे –

१) बुरशीनाशकाच्या द्रावणात बी भिजवणे :

प्रथमतः १०० किलो बियाण्यामध्ये १ लिटर पाणी टाकून याप्रमाणात भांड्यात १ मिनीटभर घोळून ओलसर करावे. नंतर त्यात बुरशीनाशक दिलेल्या प्रमाणात टाकून पुन्हा हे बियाणे ५ मिनिटांपर्यंत लाकडी दांडा अथवा उलथने वापरून चांगले घोळावे. बियाणे मिश्रण कोरडे होईपर्यंत ही घोळण्याची प्रक्रिया चालू ठेवावी. मोठ्या प्रमाणावर बियाणे प्रक्रिया करावयाची झाल्यास पाण्याच्या प्रमाणात थोडीफार वाढ करावी, जेणेकरून बुरशीनाशक बियाण्यास सारख्या प्रमाणात सहजतेने चिकटेल त्यानंतर प्रक्रिया केलेले बियाणे सावलीत वाळवून पेरणीसाठी वापरावे.

२) बियाण्यास बुरशीनाशकाची भुक्ती (पावडर) चोळणे :

बियाणे प्रक्रिया शिफारशीमध्ये दिलेल्या शिफारशीनुसार १ किलो बियाण्यास लागणाऱ्या बुरशीनाशकाचे प्रमाण घेऊन बियाण्यास चोळावे. तत्पूर्वी बियाण्यास पाण्याचा शिंपडा देऊन ओले करून घ्यावे. अशी प्रक्रिया करताना, हातामध्ये रबरी किंवा प्लॅस्टिकचे हातमोजे वापरावेत. बुरशीनाशकाची घडसर द्रावणाची प्रक्रिया करावी. (ही प्रक्रिया मशिन किंवा यंत्राद्वारे करावी) प्रथमतः १०० किलो बियाण्यांमध्ये १ लिटर पाणी टाकून ते ओलसर बियाणे बिजप्रक्रिया ड्रममध्ये घ्यावे, नंतर त्यात बुरशीनाशक दिलेल्या प्रमाणात टाकून ३० ते ४० वेळा फिरवावे. बियाणे मिश्रण कोरडे होईपर्यंत ही घोळण्याची प्रक्रिया चालू ठेवावी. मोठ्या प्रमाणावर बियाणे प्रक्रिया करावयाची झाल्यास पाण्याच्या प्रमाणात थोडीफार वाढ करावी, जेणेकरून बुरशीनाशक बियाण्यास सारख्या प्रमाणात सहजतेने चिकटेल, त्यानंतर प्रक्रिया केलेले बियाणे सावलीत वाळवून पेरणीसाठी वापरावे.

जिवाणू संवर्धन बीजप्रक्रियेबाबतची दक्षता

- जिवाणू संवर्धन प्रक्रिया ही बुरशीनाशके किंवा कीटकनाशकांची प्रक्रिया केल्यानंतर शेवटी करण्यात यावी.
- रायझोबीयम जिवाणू संवर्धनाची प्रक्रिया पाकिटावर नमूद केलेल्या विशिष्ट पिकाच्या गटसमूहास करावी.
- ट्रायकोडर्मा (जैविक बुरशीनाशक) सोबत रायझोबीयम अँझोटोबॅक्टर, स्फुरद विरघळणारे जिवाणू संवर्धकांची बीज प्रक्रिया करता येते.

जिवाणू संवर्धकांची बीज प्रक्रिया

- २५० ग्रॅम जिवाणू संवर्धनाचे पाकीट १० ते १५ किलो बियाण्यास वापरावे.
- १ लिटर पाण्यात १२५ ग्रॅम गूळ टाकून द्रावण उकळून घ्यावे.
- द्रावण थंड झाल्यावर त्यामध्ये २५० ग्रॅम जिवाणू संवर्धन टाकून बियाण्यास हळूवारपणे लावावे किंवा जिवाणू संवर्धकाचा लेप बियाण्यावर समप्रमाणात बसेल व बियाणाचा पृष्ठभाग खराब होणार नाही, याची काळजी घ्यावी किंवा बियाणे ओलसर करून जिवाणू संवर्धन सारख्या प्रमाणात बियाण्यास लावावे, नंतर बियाणे सावलीत सुकवावे.
- बीज प्रक्रिया केलेल्या बियाण्याची पेरणी (२४ तासात)ताबडतोब करावी

जिवाणू संवर्धन / बुरशीनाशके	पीक	बीज प्रक्रियेची मात्रा (प्रति किलो बियाणे)	हेक्टरी नत्र स्फुरद युक्त खताची वचत	शेकडा उत्पादनात वाढ (%)
अँझोटोबॅक्टर	कापूस, ज्वारी, भात इ.	२५ ग्रॅम	१०-२० किलो	५ ते १०
रायझोबियम	सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, इ. डाळवर्गीय व गळीतधान्य पिके	२५ ग्रॅम	२०-२५ किलो	२० ते २५
स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू (पी.एस.बी.)	सर्व पिकांकरिता	२० ग्रॅम	शिफारशीत मात्रेच्या २५ टक्के बचत	१० ते १५
ट्रायकोडर्मा (जैविक बुरशीनाशक)	सर्व पिकांकरिता	४ ग्रॅम	१०-२५ किलो	२० ते ३०

पिकाचे नाव	बीजप्रक्रिया शिफारस	कीड/रोगाचे नाव
अ. तृणधान्य पिके		
खरीप ज्वारी	३ किलो मीठ १० लिटर पाण्यात मिसळावे (३० टक्के मिठाचे द्रावण) या द्रावणात बी ओतावे व ढवळावे. द्रावणावर तरंगणारे बी बाहेर काढून जाळावे. तळाला राहिलेले बी काढून ३ वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवावे व सावलीत वाळावावे. - गंधक ३०० मेश ४ ग्रॅम किंवा थायरम ७५ टक्के ३ ग्रॅम / किलो बियाणे या प्रमाणात बीजप्रक्रिया करावी. २०० ग्रॅम कार्बोसल्फान (२५ एस डी) १ किलो बियाण्यास चांगले मिसळावे. - अँझोटोबॅक्टर व स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू (पी.एस.बी.) प्रत्येकी २५० ग्रॅम/१० किलो बियाणे या प्रमाणात बियाणास चोळावे व अर्धा तास सावलीत सुकवावे २ किलो मीठ १० लिटर पाण्यात मिसळावे (२० टक्के मिठाणे) या द्रावणात बी ओतावे व ढवळावे. द्रावणावर तरंगणारे बी बाहेर काढून जाळावे. तळाला राहिलेले बी काढून ३ वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवावे व सावलीत वाळावावे. - मेटालॅक्झील / अँप्रॉन ३५ टक्के एस.डी. ६ ग्रॅम / किलो बियाणे प्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी. २५० ग्रॅम अँझोस्पिरिलम १० किलो बियाण्यास चोळून पेरणी करावी. किंवा - शेवटी अँझोटोबॅक्टर व स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू (पीएसबी) प्रत्येक २५० ग्रॅम/१० किलो बियाणे या प्रमाणात बियाण्यावर बीजप्रक्रिया करून बियाणे अर्धा तास सावलीत सुकवावे व पेरणी करावी	अरगट, काणी
बाजरी	अँझोटोबॅक्टर आणि स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू प्रत्येकी २५० ग्रॅम व ट्रायकोडर्मा ५० ग्रॅम प्रति १० किलो बियाण्यावर बीजप्रक्रिया करावी. बियाणे अर्धा तास सावलीत सुकवून पेरणी करावी	खोडमाशी नत्र स्थिरी करणासाठी व स्फुरद उपलब्धतेसाठी अरगट
मका	३०० ग्रॅम मीठ १० लि. पाण्यात विरघळावे व या द्रावणात बी ओतावे आणि ढवळावे. द्रावणावर तरंगणारे बी बाहेर काढून जाळावे. तळाला राहिलेले बी काढून ३ वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवावे व सावलीत वाळावावे. वरील प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या बियाण्यास ३ ग्रॅम थायरम किंवा कार्बेन्डॅझिम २ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे या प्रमाणात चोळून पेरणी करावी. बियाण्यास ५० टक्के कार्बेन्डॅझिम आणि थायरम ५० टक्के प्रत्येकी २ ग्रॅम / किलो बियाण्यास संयुक्त बीजप्रक्रिया करावी. - मॅन्कोझेब ७५ टक्के पा.मि. अधिक कार्बेन्डॅझिम ५० टक्के प्रत्येकी २ ग्रॅम / किलो बियाण्यास संयुक्त बीजप्रक्रिया करावी. अँझोटोबॅक्टर व स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू (पीएसबी) प्रत्येकी २५० ग्रॅम / १० किलो बियाणे या प्रमाणात बियाणास चोळावे व अर्धा तास सावलीत सुकवावे	गोसावी नत्र स्थिरी करणासाठी व स्फुरद उपलब्धतेसाठी नत्र स्थिरीकरणासाठी व स्फुरद उपलब्धतेसाठी. तसेच बियाण्यापासून व जमिनीतील रोगांकरिता करपा, पिंगट ठिपके उदबत्या रोग, कडा करपा उदबत्या रोग ग्रेन डिसकलरेशन नत्र स्थिरी करणासाठी व स्फुरद उपलब्धतेसाठी
भात	३०० ग्रॅम मीठ १० लि. पाण्यात विरघळावे व या द्रावणात बी ओतावे आणि ढवळावे. द्रावणावर तरंगणारे बी बाहेर काढून जाळावे. तळाला राहिलेले बी काढून ३ वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवावे व सावलीत वाळावावे. वरील प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या बियाण्यास ३ ग्रॅम थायरम किंवा कार्बेन्डॅझिम २ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे या प्रमाणात चोळून पेरणी करावी. बियाण्यास ५० टक्के कार्बेन्डॅझिम आणि थायरम ५० टक्के प्रत्येकी २ ग्रॅम / किलो बियाण्यास संयुक्त बीजप्रक्रिया करावी. - मॅन्कोझेब ७५ टक्के पा.मि. अधिक कार्बेन्डॅझिम ५० टक्के प्रत्येकी २ ग्रॅम / किलो बियाण्यास संयुक्त बीजप्रक्रिया करावी. अँझोटोबॅक्टर व स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू (पीएसबी) प्रत्येकी २५० ग्रॅम / १० किलो बियाणे या प्रमाणात बियाणास चोळावे व अर्धा तास सावलीत सुकवावे	

ब. गळीतधान्य पिके

सोयाबीन	२० ग्रॅम थायरम ७५ टक्के पा. मि. प्रति १० किलो बियाण्यावर चोळावे. - रायझोबियम, स्फुरद विरघळणारे जिवाणू २५० ग्रॅम व ट्रायकोडर्मा ४० ग्रॅम प्रति १० किलो बियाण्यावर बीज प्रक्रिया करावी. बियाणे अर्धा तास सावलीत सुकवून पेरणी करावी. (प्रथम बुरशीनाशकाची प्रक्रिया करावी. नंतर रायझोबियम व इतरची प्रक्रिया करावी.)	बियाण्यापासून उद्भवणारे रोग
भुईमूग	- क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के किंवा किर्नालफॉस २५ टक्के प्रवाही २ लिटर ८० किलो बियाणे. - थायरम ५ ग्रॅम अथवा कॅन्टन / कार्बेन्डॅझिम २ ग्रॅम प्रति किलो बियाण रायझोबियम आणि स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू प्रत्येकी २५० ग्रॅम व ट्रायकोडर्मा ५० ग्रॅम प्रति १० किलो बियाण्यावर बीजप्रक्रिया करावी. बियाणे अर्धा तास सावलीत सुकवून पेरणी करावी	नत्र स्थिरी करणासाठी व स्फुरद उपलब्धतेसाठी हुमणी जमिनीतून उद्भवणाऱ्या रोगाकरिता उदा. मर /मुळ कुजव्या, खोड कुजव्य नत्र स्थिरीकरणासाठी व स्फुरद उपलब्धते साठी. तसेच जमिनीतून होणारे रोग जसे मर,मूळकुजव्या इ
सूर्यफूल	- कॅन्टान ८० टक्के किंवा थायरम ७५ टक्के किंवा कार्बेन्डॅझिम ५० टक्के २० ग्रॅम प्रति १० किलो बियाणे या प्रमाणात चोळून पेरणी करावी. - रायझोबियम आणि स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू प्रत्येकी २५० ग्रॅम व ट्रायकोडर्मा ५० ग्रॅम प्रति १० किलो बियाण्यावर बीजप्रक्रिया करावी. बियाणे अर्धा तास सावलीत सुकवून पेरणी करावी.	बियाण्यापासून उद्भवणारे रोग जसे रायझोकोटोनिया, स्क्लेरोशियम नत्र स्थिरीकरणासाठी व स्फुरद उपलब्धतेसाठी

क. कडधान्य पिके

तूर, उडीद, सुग	- कॅन्टान ८० टक्के किंवा थायरम ७५ टक्के २० किंवा कार्बेन्डॅझिम १५ ग्रॅम प्रति १० किलो बियाणे या प्रमाणात चोळून पेरणी करावी. - रायझोबियम आणि स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू प्रत्येकी २५० ग्रॅम व ट्रायकोडर्मा ४० ग्रॅम प्रति १० किलो बियाण्यावर बीज प्रक्रिया करावी. बियाणे अर्धा तास सावलीत सुकवून पेरणी करावी.	जमिनीतून व बियाणाव्दारे होणारे रोग जसे मर, मूळकुजव्या इ.साठी नत्र स्थिरीकरणासाठी व स्फुरद उपलब्धतेसाठी
----------------	---	--

ड. नगदी पिके

कापूस	- कॅन्टान ८० टक्के पा. मि. ग्रॅम प्रति किलो बियाणे किंवा थायरम ७५ टक्के पा. मि. ६ ग्रॅम प्रतिकिलो बियाणे किंवा कार्बेन्डॅझिम ५० टक्के पा. मि. १.५ ग्रॅम प्रतिकिलो बियाणे किंवा कार्बेन्डॅझिम ७५ टक्के पा. मि. १० ग्रॅम प्रति किलो बियाणे या प्रमाणात मिसळून बीज प्रक्रिया करावी. - अँझोटोबॅक्टर आणि स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू प्रत्येकी २५० ग्रॅ. व ट्रायकोडर्मा ५० ग्रॅ. प्रति १० किलो बियाण्यावर बीजप्रक्रिया करावी. बियाणे अर्धा तास सावलीत सुकवून पेरणी करावी	बियाण्यापासून उद्भवणारे रोग
ऊस	- उष्णजल प्रक्रिया – बेणे ५०० से. तापमानाच्या पाण्यात २ तास बुडवून ठेवावे किंवा उष्ण हवेची प्रक्रिया – बेणे ५४० सें. तापमानात ४ तास ठेवावे. - कार्बेन्डॅझिम १०० ग्रॅम व मॅलेथिऑन ३०० मि.लि. अथवा डाय मिथोएट २६५ मि. ली. १०० लिटर पाण्यात मिसळून बेणे या द्रावणात १५ मिनिटे बुडवून घ्यावे. - अँसीटोबॅक्टर, अँझोस्पिरिलम आणि स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू प्रत्येकी १.२५ किलो अधिक ट्रायकोडर्मा १ किलो प्रति १०० लिटर पाण्यात द्रावण तयार करून त्यात बेणे ५ मिनिटे बुडवून घ्यावे व लागवड करावी.	नत्र स्थिरीकरणासाठी व स्फुरद उपलब्धतेसाठी तसेच बियाण्यापासून उद्भवणारे रोग गवताळ वाढ / चाबूक काणी रोग, मूळकुजव्या रोग नत्र स्थिरीकरणासाठी व स्फुरद उपलब्धतेसाठी
