



वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारीत व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

अ.क्र.	तपशील	सविस्तर माहिती
१	पीक/वाणाचे नाव	कापूस : एनएचएच ४४
२	प्रसारीत केल्याचे वर्ष	१९८४
३	प्रसारीत करणारी संस्था/विद्यापीठ	वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी
४	जमीन	मध्यम ते काळी, खोल
५	हवामान	उष्ण ते समशीतोष्ण, उबदार
६	पेरणी/लागवडीचा कालावधी	बागायती : २५ मे - ७ जून कोरडवाहू : ७० - ८० मिमी पाऊस पडल्यानंतर (१५ जुलैच्या अगोदर)
७	प्रती एकर बियाणे	बागायती : १ - १.२ कि.ग्रॅ. प्रती एकर कोरडवाहू : १.२ - १.६ कि.ग्रॅ. प्रती एकर
८	पीक व्यवस्थापन	
१	लागवडीचे/पेरणीचे व्यवस्थापन	बागायती लागवड २५ मे नंतर करावी तर कोरडवाहू लागवड मॉन्सूनचा ७० ते ८० मिमी. पाऊस पडल्यानंतर करावी. कापसाची लागवड १५ जुलैनंतर करू नये. लागवडीचे अंतर : बागायती - ९० X ९० सेंमी किंवा १२० X ९० सेंमी कोरडवाहू - ९० X ६० सेंमी
२	खत व्यवस्थापन	बागायती - १००:५०:५० किग्रॅ नत्र, स्फुरद व पालाश / हेक्टर कोरडवाहू - ८०:४०:४० किग्रॅ नत्र, स्फुरद व पालाश / हेक्टर संपूर्ण स्फुरद व पालाश लागवडीच्या वेळी द्यावी. नत्राची मात्रा बागायतीमध्ये लागवडीच्या वेळी, १ व २ महीन्यानंतर अनुक्रमे २०%, ४०% व ४०% प्रमाणात द्यावे. कोरडवाहू लागवडीमध्ये नत्र लागवडीच्या वेळी व १ महीन्यानंतर प्रत्येकी ५० % या प्रमाणात द्यावे.
३	पाणी व्यवस्थापन	बागायती लागवडीमध्ये पाऊस पडे पर्यंत जमिनीच्या मगदुरानुसार ८ ते १० दिवसाच्या अंतराने पाणी द्यावे. पीक वाढीच्या काळात पाऊसाचा खंड असल्यास पाते- फुले लागणे, बोंडे लागणे व बोंडे भरण्याच्या अवस्थेत पाणी द्यावे.
४	कीड व्यवस्थापन	रस शोषण करणाऱ्या किडी (मावा, तुडतुडे व फुलकिडे) व्यवस्थापन - निंबोळी अर्क ५% किंवा असिटामिप्रिड २५ एसपी २ ते ४ ग्रॅम किंवा थायमिथॉक्झाम २५ डब्ल्युजी २.५ ग्रॅम किंवा फ्लोनिकामीड ५० डब्ल्युजी ४ ग्रॅम पांढरी माशी - ट्रायझोफॉस ४० ई सी १६-२० मिली किंवा अॅसिफेट ७५ एसपी ३० ग्रॅम किंवा डायफेन्थुरॉन ५० डब्ल्युजी ८

		<p>ग्रॅम</p> <p>अळी : ठिपक्याची बोंडअळी, हिरवी बोंडअळी, शेंदरी बोंडअळी व पाने खाणारी अळी</p> <p>व्यवस्थापन- कार्बारील ५०% भुकटी ४० ग्रॅम किंवा प्रोफेनोफॉस ५० ईसी २० मिली किंवा थायोडीकार्ब ७५ डब्ल्युपी २० ग्रॅम किंवा स्पिनोसॅड ४५ एससी ४ मिली किंवा ईंडोक्झाकार्ब १४.५ ईसी १० मिली.</p> <p>कीटकनाशकाचे प्रमाण प्रती १० लीटर पाणी नॅपसॅक पंपासाठी. पावर स्प्रेअरसाठी प्रमाण ३ पट वापरावे.</p>
	५ रोग व्यवस्थापन	<p>दहिया- गंधक ३०० मेश भुकटी २० किग्रॅ / हेक्टर धुरळणी किंवा कार्बेन्डेझीम १० ग्रॅम प्रती १० ली.</p> <p>मर रोग- कॉपर ऑक्झीक्लोराईड २५ ग्रॅम प्रती १० ली. प्रमाणात आळवणी</p> <p>बुरशीजन्य करपा- सुडोमोनास फ्लुरोसन्स ०.२ टक्के फवारणी</p>
९	पिकाचा कालावधी	१६०-१७० दिवस
१०	उत्पादकता	बागायती : २२ - २३ किं. / हे. (८.८ - ९.२ किं. / एकर) कोरडवाहू : १० - १२ किं. / हे. (४ - ६ किं. / एकर)
११	वाणाची वैशिष्ट्ये/विशेष गुणधर्म	<ol style="list-style-type: none"> १. पुनर्बहार क्षमता २. विविध हंगामात उत्पादनामध्ये सातत्य ३. रस शोषण करणा-या किडींना सहनशील ४. कोरडवाहू तसेच बागायतीसाठी उपयुक्त
१२	वाणासंबंधीचे छायाचित्रे	