



वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारीत व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

अ.क्र.	तपशील	सविस्तर माहिती
१	पीक/वाणाचे नाव	भुईमूग : भुईमूग नं. ०१ (उपटा वाण)
२	प्रसारीत केल्याचे वर्ष	२००६
३	प्रसारीत करणारी संस्था/विद्यापीठ	वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी
४	जमीन	मध्यम, पाण्याचा चांगला निचरा होणारी, मऊ, भुसभुशीत, वाळूमिश्रित, चुना व सेंद्रीय पदार्थ असलेली जमीन योग्य. सामू ६.५ ते ७.५ असावा.
५	हवामान	१. भुईमूग पिकाच्या कायिक वाढीसाठी सरासरी तापमान २५ ते ३० अंश सेल्सियस आवश्यक असते. २. पुनरुत्पादनक्षम वाढीसाठी (फुलोरा, अ-या लागणे, शेंगा धारणा आणि वाढ) तापमान २५ ते ३५ अंश सेल्सियस आवश्यक असते. खरीप, रब्बी, उन्हाळी
६	पेरणी/लागवडीचा कालावधी	खरीप : २१ जून ते १० जुलै रब्बी : १५ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर उन्हाळी : १५ जानेवारी ते ३० जानेवारी
७	प्रती एकरी बियाणे	४० किलो प्रती एकरी
८	पीक व्यवस्थापन	
१	लागवडीचे/पेरणीचे व्यवस्थापन	बीजप्रक्रिया — पेरणीपूर्वी प्रती किलो बियाण्यास ३ ग्रॅम कार्बोन्डेझीम हे बुरशीनाशक चोळावे. त्यानंतर प्रती १० किलो बियाण्यास २५० ग्रॅम रायझोबियम व २५० ग्रॅम स्फुरद विरघळणा-या जीवाणूची बीजप्रक्रिया करावी. लागवड- उपटा वाण दोन ओळीतील अंतर ३० सेंमी ठेवावे व दोन रोपातील अंतर १० सेंमी आंतरमशागत — पेरणी झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या अंतराने २ कोळपण्या व २ खुरपण्या कराव्यात. पिकाला आ-या लागल्यानंतर आंतरमशागतीची कामे करू नयेत. रासायनिक तण नियंत्रणासाठी पॅडिमिथॅलिन ३० ई. सी. २.५ ते ३.३ लीटर प्रती हेक्टर ७५० ते १००० लीटर पाण्यात मिसळून पेरणीनंतर परंतु उगवणीपूर्वी फवारवे (प्रती १० लीटर पाण्यात २५ ते ३३ मिली पॅडिमिथॅलिन)
२	खत व्यवस्थापन	१. शेवटच्या वखराच्या पाळी आधी हेक्टर १० टन चांगले कुजलेले शेणखत किंवा कंपोस्ट खत जमीनीत मिसळावे. २. भुईमूगाला प्रती हेक्टर २५ कि.ग्रॅ. नज व ५० कि.ग्रॅ. स्फुरद या प्रमाणात रासायनिक खते द्यावीत. शक्य असल्यास नजाची मात्रा अमोनियम सल्फेटमधून द्यावी. कारण या खतात सुमारे

		<p>२० % नत्र अमोनियाच्या स्वरुपात असून यात गंधक देखील उपलब्ध होतो.</p> <p>३. अमोनियम सल्फेट उपलब्ध नसल्यास नजाची माजा युरिया या खतातून द्यावी व स्फुरदसाठी सिंगल फॉस्फेटमधून द्यावी कारण या खतात १६ टक्के स्फुरद, १९.५ टक्के कॅल्शियम व १२.५ टक्के गंधक असते.</p> <p>४. ४०० ते ५०० किलो हेक्टरी जिप्सम फुलधारणेच्या सुरवातीला जमिनीत मिसळावे.</p>
३	पाणी व्यवस्थापन	<p>१. पहिले पाणी फुलोरा अवस्था : ३० ते ४० दिवस</p> <p>२. दुसरे पाणी आ-या भरण्याची अवस्था : ४० ते ४५ दिवस</p> <p>३. तिसरे पाणी शेंगा भरण्याची अवस्था : ६५ ते ७० दिवस</p> <p>रब्बी हंगामात १५ ते २० दिवसाच्या अंतराने ६ ते ८ पाण्याच्या पाळ्या</p> <p>उन्हाळी हंगामात ०८ ते १० दिवसाच्या अंतराने १० ते १२ पाण्याच्या पाळ्या</p> <p>पाण्याचे व्यवस्थापनाकरीता तुषार सिंचनाचा वापर करावा.</p>
४	कीड व्यवस्थापन	<p>१. भुईमुगावरील पाने पोखरणा-या व रस शोषणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी ५ टक्के निंबोळी अर्काच्या फवारणीची शिफारस करण्यात येते.</p> <p>२. भुईमुगावरील स्पोडोप्टेरा अळीच्या व्यवस्थापनासाठी, इमोमेक्टिन बेंझोएट ५ डब्ल्युएसजी (२ ग्रॅम / १० लीटर पाणी किंवा स्पीनोसॅड ४५ एससी (३ मिली/१० लीटर पाणी या कीटकनाशकाची फवारणी करावी.</p> <p>३. भुईमुगातील एकात्मिक कीड व्यवस्थापन :</p> <p>कीडींचे चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन, रासायनिक कीटकनाशकांच्या कमी वापरामुळे वाढलेली मित्र किडींची संख्या व किफायतशीरपणा लक्षात घेता भुईमुगातील एकात्मिक कीड व्यवस्थापनासाठी खालील आराखड्याची शिफारस करण्यात येते.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जमिनीतील किडींच्या सुप्तावस्था व कोष नष्ट करण्यासाठी उन्हाळ्यात खोल नांगरट करावी. ● भुईमूग पिकाच्या चारही बाजूने एरंडी व सोयाबीन पिकाची लागवड करावी. ● तंबाखुवरील अळी, घाटे अळी, पाने गुंडाळणारी अळीसाठी १० कामगंध / हेक्टरी लावावेत. ● तंबाखुवरील पाने खाण-या अळीने अंडीपुंज व प्रथम अवस्थेतील अळ्या वेचून नष्ट कराव्यात. ● निंबाळी अर्क ५ टक्के २० व ३० व्या दिवशी फवारणी करावी. ● किडींनी आर्थिक नुकसानची पातळी गाठल्यास शिफारस

		<p>केलेल्या कीटकनाशकाची फवारणी करावी (मोनोक्रोटोफॉस ३६ एस.एल. १५ मिली/ १० ली.)</p> <p>४. भुईमुगावर तुडतुडे व फुलकिंड्यांचा प्रादुर्भाव दिसताच प्रभावी व्यवस्थापनासाठी थायमिथॅक्झाम २५ डब्ल्यु जी २०० ग्रॅम हे. किंवा असिटामीप्रीड २० एस पी १०० ग्रॅम हे. यापैकी एका कीटकनाशकाची फवारणी करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.</p>
	५ रोग व्यवस्थापन	<p>भुईमुगाच्या पानावरील उशिरा येणा-या टिक्का व तांबेरा (करपा) या रोगांच्या नियंत्रणासाठी बुरशीनाशकाच्या ३ फवारण्या कार्बेन्डॅझिम ०.०५ टक्के अधिक मॅन्कोझेब ०.२५ टक्के पेरणीनंतर ४५,५५,७५ दिवसांनी कराव्यात.</p>
९	पिकाचा कालावधी	११० ते ११५ दिवस
१०	उत्पादकता	<p>खरीप : १०-१२ किं/हे.</p> <p>रब्बी / उन्हाळी : १६ ते १८ किं/हे.</p>
११	वाणाची वैशिष्ट्ये/विशेष गुणधर्म	<ol style="list-style-type: none"> १. टिक्का, तांबेरा, खोडकुजव्या, शेंडेमर रोगास सहनशील. २. सर्व शेंगा एकदाच परिपक्व होतात. ३. तेलाचे प्रमाण ५१.२ टक्के ४. शेंगदाण्याचे प्रमाण ६९ टक्के ५. १०० दाण्याचे वजन (ग्रॅम) ४० ६. काढणीवेळी जमिनीत शेंगा राहण्याचे प्रमाण अल्प
१२	वाणासंबंधीचे छायाचित्रे	